

A-DES (Adolescent Dissociative Experiencing Scale)

Författare/Skapare

Armstrong, Judith, Bernstein-Carlsson, Eva och Putnam, Frank.

Beskrivning av ursprungligt syfte med instrumentet

Screeningformulär som används för att fånga dissociativa symtom. Visat god användbarhet för screening av dissociativa fenomen hos svenska ungdomar och värdefullt som ett screeninginstrument för en klinisk grupp av sexuellt utsatta svenska ungdomar.

Krav på utbildning för användare

Inga formella krav.

Målpopulation

12-20 år

Versioner

Finns svensk version utarbetad av Nilsson, D. m.fl.

Antal items/Administreringstid

30 frågor. Svaren anges mellan 1 och 10.

Reliabilitet

Cronbachs α = .95, och test-retest = .71.

Validitet

God

Normer/Svenska normer

Finns svenska normer i Nilsson m.fl. (2006a).

Cutoff-värden

Poängnivåerna i normalgruppen ligger lägre i svenska undersökningar än vad som rapporterats från andra länder, se Nilsson m.fl. (2006a).

Cutoff-värde = 30. För att sammanställa resultatet på ADES: Summera antalet råpoäng som barnet fyllt i på samtliga frågor på ADES och jämför sedan det resultatet med cutoff värdet 30.

Den version av ADES som Barnafriad tillhandahåller har 30 frågor. Enligt Doris Nilsson (2023-10-30) kan det finnas en version av ADES med enbart 28 frågor. Som användare av ADES stäm av vilken version du använt och var medvetna om detta vid rättning då cutoff- värdet på 30 stämmer mer överens för ADES versionen med 30 frågor.

Licensinnehavare och/eller distributör (Adress/hemsida)

Översatt med tillstånd från författarna. Ingen copyright.

Kostnad (initial-fortsatt användning)

Ingen kostnad.

Referenser

Nilsson, D., Svedin, C-G. (2006a). Dissociation among Swedish Adolescents and the connection to trauma. An Evaluation of the Swedish version of Adolescent Dissociative Experience Scale. *The Journal of Nervous and mental Diseases*. 194, 684-689.

Nilsson, D., Svedin, C-G. (2006b). Evaluation of the Swedish Version of Dissociation Questionnaire (DIS-Q), Dis-Q-Sweden, Among Adolescents. Experience Scale. *Journal of Trauma & Dissociation*. 7, 65-89.

Svedin, C-G., Nilsson, D., Lindell, C. (2004). Traumatic experiences and dissociative symptoms among Swedish adolescents. A pilot study using Dis.Q-Sweden. *Nordic journal of Psychiatry* 58, 349-355.

Armstrong J., Putnam F. W., Carlson E., Libero D., Smith S. (1997). Development and validation of a measure of adolescent dissociation: The Adolescent Dissociative Experience Scale. *Journal of Nervous & Mental Disease*, 185, 491-49.

Zoroglu S. S., Sar V., Tuzun U., Tutkun H., Savas H A. (2002) Reliability and Validity of the Turkish version of the Adolescent Dissociative Experiences Scale. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 56, 551-556.

Farrington A, Waller G, Smerden J., Faupel A. W. (2001) The Adolescent Dissociative Experiences Scale: Psychometric Properties and difference in Scores Across Age Groups. *Journal of Nervous and Mental Disease* 189, 722-727.

Uppdaterat 2023-10-30